

Microme knox

ไมโครม นีอค

สำหรับสัตว์เคี้ยว



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรค แนะนำให้ใช้ ที่ฟีด อินโบดิกส์ 1-2% ของปริมาณน้ำหรือน้ำหมักอาหาร ผสมน้ำหรือคลุกเคล้ากับอาหารสัตว์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงและยังช่วยเพิ่ม ADG และ FCR ที่ดีขึ้น



บำบัดเชื้อจุลินทรีย์

anti microorganism

ประโยชน์

ไมโครม นีอค เป็นผลิตภัณฑ์แร่ธาตุจากธรรมชาติ คุณภาพสูง ลักษณะเป็นผงแห้ง ใช้งานง่าย สามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้ง และควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคกับสัตว์ เช่น หวัดนก, ปากเปื่อย, เท้าเปื่อย ลดกลิ่นที่เกิดจากก๊าซแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซมีเทน และของเสียต่างๆ รวมถึงช่วยดูดซับของเหลวและสิ่งปฏิกูลภายในฟาร์มให้แห้ง จึงทำให้สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ปราศจากสารเคมีที่อันตรายเจือปน จึงปลอดภัยกับผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง

วิธีใช้

- ใช้เป็นวัสดุรองพื้น โดยหว่านลงบนพื้นภายในฟาร์มทุกๆ 2 สัปดาห์ อัตรา ไมโครม นีอค 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น และรักษาสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม
- ใช้หว่านลงพื้นภายในฟาร์มทุกๆ 3-5 วัน เพื่อลดกลิ่นมูลสัตว์ อัตรา ไมโครม นีอค 0.5 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
- กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้โรยพื้นคอกและบริเวณโดยรอบ เพื่อยับยั้งและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคกับสัตว์ โดยหว่านไมโครม นีอค กระจายปูพื้น ให้มีความหนาประมาณ 5 ซม. เพื่อให้สัตว์เหยียบย่ำ และให้ผลิตภัณฑ์แทรกซึมเข้าไปในเท้าของสัตว์ แล้วนำสัตว์ออกจากคอกเดิมเป็นเวลา 3-5 วัน เพื่อเป็นการพักคอก

คำเตือน/ข้อควรระวัง

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือสูดดม
3. ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะหว่านควรอยู่เหนือลม
4. ควรล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

อาการที่พบ

1. หากเข้าตา อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกตา
2. หากกลืนกินในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
3. การสัมผัสผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ยกเว้นผู้ที่ผิวหนังแพ้ง่าย ควรสวมถุงมือขณะใช้งาน

วิธีเก็บรักษา

1. เก็บไมโครม นีอค ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่
2. เก็บไมโครม นีอคในที่ร่ม และแห้ง
3. เก็บให้พ้นมือเด็ก และเก็บให้ห่างจากอาหารน้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความชื้น

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. ถ้าเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด หากอาการยังไม่ทุเลา ควรไปพบแพทย์
2. หากกลืนกินปริมาณมาก และเกิดอาการปวด จุก เสียด หรือแน่นท้อง ควรไปพบแพทย์